

# ミノキシオンについて

第1類医薬品

ミノキシオン(SN)

第1類医薬品

ミノキシオン

第1類医薬品

発毛剤

はじめました。

60ml入

3850円

ミノキシジル 100ml中 5g配合

※詳しくは医師にご相談下さい

ミノキシオンは「壮年性脱毛症における発毛剤」です。


リアップなどと同じ「ミノキシジル」という成分が含まれています。

(ミノキシジルの含有量は100mlあたり5g)


## ■使い方

1回の使用量(1mL)を以下1~5の方法で塗布してください。


- 1** ボトルを立ててキャップを真上にはずします。次に回転部の「△」マークを矢印の方向に回して、「▲はかる」マークに合わせます。  
 注意：キャップを回したり、斜めにはずすと、故障の原因になります。  
 「▲はかる」マークをこえて無理に回すと故障の原因になります。




- 2** ボトルが真下を向くよう逆さにします(2~3秒程度)。逆さにすると薬液1mLがたまります。  
 注意：逆にした後ボトルを揺らないでください。薬液がたれる可能性があります。



- 3** 薬液がたまったら、ボトルを真下に向けたまま回転部の「△」マークを矢印の方向に回して、「▲ぬる」マークに合わせます。「▲ぬる」マークに合わせることで、1回の使用量(1mL)が計量されます。  
 注意：回転部の「△」マークが「▲ぬる」マークにしっかり合っていないと、1mLを正しく計量できません。また、塗布する際、一度に多量の薬液が出たり、ボトル本体から1mLを超えて薬液が出続けてしまう場合があります。



- 4** 逆さのまま回転部の先端を頭皮に垂直に軽く押し当てると、薬液が出てきます。薬液が完全に出なくなるまで、髪の薄い部分にトントンと1~2cm間隔で塗布してください。  
 注意：回転部の「△」マークが「▲はかる」マークに合っているときは、回転部の先端が押しこめない仕様となっており、無理に塗布すると頭皮をきずつける可能性があります。



- 5** 使用後は、回転部の「△」マークを「▲ぬる」マークに合わせたまま、キャップを開けて保管してください。

( 付属の説明書裏面に記載 )

## ■主な副作用

使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	頭皮の発疹・発赤*、かゆみ、かぶれ、ふけ、使用部位の熱感等
精神神経系	頭痛、気が遠くなる、めまい
循 環 器	胸の痛み、心拍が速くなる
代 謝 系	原因のわからない急激な体重増加、手足のむくみ

( 説明書表面に記載 )

最も一般的な副作用は頭皮の痒みです。

また、過剰な使用は低血圧の原因となる可能性があります。